


PARÁSITOS EN HECES

1. Recoger las heces en un recipiente limpio y seco que no contenga restos de jabón ni desinfectante. No usar heces contaminadas con agua, orina o papel higiénico.
2. Desenroscar el tapón del contenedor con líquido y colocarlo en una superficie plana para evitar derrames. Desechar el tapón.
3. Utilizar la cucharilla verde que está unida al tubo cónico para coger una muestra del centro de las heces sin que queden restos de muestra en el exterior de la cucharilla.
4. Introducir la cucharilla con muestra de heces dentro del contenedor con líquido y cerrar enroscando fuertemente (no separar la cucharilla del tubo cónico).
5. Lavarse bien las manos con agua y jabón.



Notas:

Se recomienda una dieta que no contenga fibras, durante tres días, antes de la recogida. No comer fresas, higos, peras, manzanas, tomates, legumbres secas o verdes, pan con semillas (salvado, sésamo). No utilizar laxantes ni supositorios. No es necesario guardar la muestra en la nevera.

- El horario de entrega de muestras es de lunes a viernes de 07:00h a 11:00h, excepto los días festivo. Entregar a la administrativa de laboratorio.
- Puede entregarlo el paciente o algún otro familiar/usuario en su nombre con la tarjeta sanitaria del paciente y/o petición correspondiente.
- No se aceptará ninguna muestra mal recogida, facilitando nuevo recipiente para realizar nueva entrega.